

Well-Child Checkups and Immunizations Schedule

Birth – 12 years

Routine checkups and immunizations are one of the best ways to keep your child healthy.

BIRTH	Well-Child Checkup. Immunizations: Hep B #1, RSV* (recommended for first RSV season).	 
5 DAYS	Well-Child Checkup.	
2 WEEKS	Well-Child Checkup. Jaundice screening.	
2 MONTHS	Well-Child Checkup. Immunizations: DTaP #1, Hib #1, IPV #1, PCV#1, Rotavirus (Rota) #1, Hep B #2.	 
4 MONTHS	Well-Child Checkup. Immunizations: DTaP #2, Hib #2, IPV #2, PCV #2, Rota #2.	 
6 MONTHS	Well-Child Checkup. Immunizations: Influenza (Flu)*, DTaP #3, Hib #3, IPV #3, PCV #3, Rota #3, Hep B #3, COVID-19* (complete series).	 
9 MONTHS	Well-Child Checkup. Developmental screening. Immunizations: RSV (recommended for second RSV season for high-risk children).	 
12 MONTHS	Well-Child Checkup. Dental checkup recommended by age 1, and dental checkups bi-annually thereafter. Lead screening. Immunizations: MMR #1, Varicella #1, Hep A #1, Flu (begin annual flu), Hib #4, PCV #4.	 
15 MONTHS	Well-Child Checkup. Immunizations: DTaP #4.	 
18 MONTHS	Well-Child Checkup. Developmental screening. Immunizations: Hep A #2.	 
24 MONTHS	Well-Child Checkup. Beginning of annual visits. Lead screening. Immunizations: Flu vaccine.	 
30 MONTHS	Well-Child Checkup. Developmental screening.	
3 YEARS	Annual Well-Child Checkup. Vision checkup between ages 3–5 and annually after. Immunizations: Flu, COVID-19 (recommended single dose of updated vaccine for high-risk children).	 

4 YEARS	Annual Well-Child Checkup. Immunizations: DTaP #5, IPV#4, MMR #2, Varicella #2, Flu, any missed immunizations, COVID-19 (as recommended for high-risk children).	 
5 YEARS	Annual Well-Child Checkup. Immunizations: Flu, COVID-19 (as recommended for high-risk children).	 
6 YEARS	Annual Well-Child Checkup. Immunizations: Flu, COVID-19 (as recommended for high-risk children).	 
7 YEARS	Annual Well-Child Checkup. Immunizations: Flu, COVID-19 (as recommended for high-risk children).	 
8 YEARS	Annual Well-Child Checkup. Immunizations: Flu, COVID-19 (as recommended for high-risk children).	 
9 YEARS	Annual Well-Child Checkup. Immunizations: Flu, HPV #1*, COVID-19 (as recommended for high-risk children).	 
10 YEARS	Annual Well-Child Checkup. Immunizations: Flu, COVID-19 (as recommended for high-risk children).	 
11 YEARS	Annual Well-Child Checkup. Immunizations: Flu, Tdap #1, MCV4 #1, COVID-19 (as recommended for high-risk children).	 
12 YEARS	Annual Well-Child Checkup. Immunizations: Flu, COVID-19 (as recommended for high-risk children).	 



Checkups



Immunizations

*RSV monoclonal antibody nirsevimab is recommended for all infants aged between birth and six months old during their first RSV season, as well as high-risk children aged 8–19 months during their second RSV season.

*Flu (Influenza) vaccine is recommended for all children between 6–24 months with two doses, separated by at least four weeks.

*COVID-19 vaccine is recommended for all infants aged between 6–24 months, as well as high-risk children after two years.

*HPV (Human papillomavirus) is recommended for all children aged between 9–12 years with two doses, separated by at least five months.

Important Childhood Immunizations

Immunization	Disease/Infection Description
Hepatitis A and B Vaccine(s) (HepA, HepB)	Hepatitis means inflammation of the liver. The liver is a vital organ that processes nutrients, filters the blood and fights infections. Viruses cause Hepatitis A and B.
Rotavirus Vaccine (RV1, RV5)	Rotavirus spreads easily among infants and young children. The virus can cause severe watery diarrhea, vomiting, fever, and abdominal pain.
Diphtheria, Tetanus and Pertussis Vaccine(s) (DTaP, or Tdap for children aged 7 and over)	Diphtheria can lead to difficulty breathing, heart failure, paralysis or death. Tetanus causes painful stiffening of the muscles, including lockjaw, having trouble swallowing or breathing or death. Pertussis, also known as "whooping cough," can cause uncontrollable coughing that makes it hard to breathe, drink or eat.
Influenza Vaccine (IIV4, LAIV4-flu)	Influenza (also known as "flu") is a contagious respiratory illness caused by influenza viruses. It can cause mild to severe illness, and at times can lead to death.
Polio Vaccine (IPV)	Polio is a disabling and potentially deadly disease caused by the poliovirus. The virus can infect a person's spinal cord, causing paralysis.
Pneumococcal Conjugate (PCV15, PCV20)	Pneumococcal disease refers to any illness caused by pneumococcal bacteria. These include pneumonia, ear infections, sinus infections, meningitis and bacteremia.
COVID-19 Vaccine	COVID-19 is caused by a virus named SARS-CoV-2. It most often causes respiratory symptoms that can feel much like a cold, the flu, or pneumonia.

Immunization	Disease/Infection Description
Measles, Mumps and Rubella Vaccine (MMR)	Measles is a viral infection that causes fever, and a red, blotchy rash that usually appears first on the face and behind the ears, then spreads downward to the chest and back and finally to the feet. Mumps is a viral infection that affects the salivary glands. Symptoms include fever, headache, pain and swelling of salivary glands. Rubella is a viral infection best known by its distinctive red rash. This infection may cause mild or no symptoms in most people. However, it can cause serious problems for unborn babies whose mothers are infected during pregnancy.
Varicella Vaccine (VAR-chickenpox)	Chickenpox is a highly contagious disease caused by a virus. It can cause an itchy, blister-like rash. The rash appears first on the chest, back, and face, and then spreads over the entire body.
Meningococcal Disease Vaccine(s) (MenACWY-CRM or MenACWY-TT)	Meningococcal disease refers to any illness caused by bacteria called <i>Neisseria meningitidis</i> . These illnesses are often severe, can be deadly, and include infections of the lining of the brain and spinal cord and bloodstream.
Tetanus and Diphtheria Vaccine (Td, only for children 7 years and older; usually given as a booster dose.)	Diphtheria can lead to difficulty breathing, heart failure, paralysis or death. Tetanus causes painful stiffening of the muscles, including lockjaw, having trouble swallowing or breathing or death.
Human Papillomavirus Vaccine (HPV)	HPV is the most common sexually transmitted infection. There are many different types of HPV. Some types can cause health problems, including genital warts and cancers.
Respiratory Syncytial Virus Vaccine (RSV)	RSV is a common respiratory virus that usually causes mild, cold-like symptoms. These include runny nose, decrease in appetite, coughing, sneezing, fever and wheezing.

Calendario de chequeos de rutina y vacunas para niños

Nacimiento – 12 años

Los chequeos de rutina y las vacunas son dos de las mejores maneras de mantener saludable a tu hijo.

NACIMIENTO	Chequeo de rutina para niños. Vacunas: Hep B #1, RSV* (recomendada para la primera temporada de RSV).	 	4 AÑOS	Chequeo de rutina para niños. Vacunas: DTaP #5, IPV#4, MMR #2, Varicella #2, Influenza, cualquier vacuna faltante, COVID-19 (según se recomienda para niños de alto riesgo).	 
5 DÍAS	Chequeo de rutina para niños.		5 AÑOS	Chequeo de rutina para niños. Vacunas: Influenza, COVID-19 (según se recomienda para niños de alto riesgo).	 
2 SEMANAS	Chequeo de rutina para niños. Prueba de detección de ictericia.		6 AÑOS	Chequeo de rutina para niños. Vacunas: Influenza, COVID-19 (según se recomienda para niños de alto riesgo).	 
2 MESES	Chequeo de rutina para niños. Vacunas: DTaP #1, Hib #1, IPV #1, PCV#1, Rotavirus (Rota) #1, Hep B #2.	 	7 AÑOS	Chequeo de rutina para niños. Vacunas: Influenza, COVID-19 (según se recomienda para niños de alto riesgo).	 
4 MESES	Chequeo de rutina para niños. Vacunas: DTaP #2, Hib #2, IPV #2, PCV #2, Rota #2.	 	8 AÑOS	Chequeo de rutina para niños. Vacunas: Influenza, COVID-19 (según se recomienda para niños de alto riesgo).	 
6 MESES	Chequeo de rutina para niños. Vacunas: Influenza (Flu)*, DTaP #3, Hib #3, IPV #3, PCV #3, Rota #3, Hep B #3, COVID-19* (serie completa).	 	9 AÑOS	Chequeo de rutina para niños. Vacunas: Influenza, HPV #1*, COVID-19 (según se recomienda para niños de alto riesgo).	 
9 MESES	Chequeo de rutina para niños. Evaluación del desarrollo. Vacunas: RSV (recomendada para la segunda temporada de RSV en niños de alto riesgo).	 	10 AÑOS	Chequeo de rutina para niños. Vacunas: Influenza, COVID-19 (según se recomienda para niños de alto riesgo).	 
12 MESES	Chequeo de rutina para niños. Se recomienda una visita dental durante el primer año y consultas dentales cada seis meses a partir de entonces. Prueba de detección de plomo. Vacunas: MMR #1, Varicella #1, Hep A #1, Influenza (inicio de vacunación anual contra la influenza), Hib #4, PCV #4.	 	11 AÑOS	Chequeo de rutina para niños. Vacunas: Influenza, Tdap #1, MCV4 #1, COVID-19 (según se recomienda para niños de alto riesgo).	 
15 MESES	Chequeo de rutina para niños. Vacunas: DTaP #4.	 	12 AÑOS	Chequeo de rutina para niños. Vacunas: Influenza, COVID-19 (según se recomienda para niños de alto riesgo).	 
18 MESES	Chequeo de rutina para niños. Evaluación del desarrollo. Vacunas: Hep A #2.	 	 Chequeo Vacunas		
24 MESES	Chequeo de rutina para niños. Prueba de detección de plomo. Vacunas: Vacuna contra la influenza.	 	<i>*El anticuerpo monoclonal contra RSV (nirsevimab) se recomienda para todos los bebés desde el nacimiento hasta los 6 meses durante su primera temporada de RSV, y para niños de alto riesgo de 8 a 19 meses durante su segunda temporada de RSV.</i>		
30 MESES	Chequeo de rutina para niños. Evaluación del desarrollo.		<i>*La vacuna contra la influenza (flu) se recomienda para todos los niños de 6 a 24 meses en dos dosis, separadas por al menos cuatro semanas.</i>		
3 AÑOS	Chequeo de rutina para niños. Examen de la vista entre los 3 y 5 años y luego anualmente. Vacunas: Influenza, COVID-19 (se recomienda una dosis única actualizada para niños de alto riesgo).	 	<i>*La vacuna contra COVID-19 se recomienda para todos los bebés de 6 a 24 meses, así como para niños de alto riesgo después de los dos años.</i>		
			<i>*La vacuna contra el VPH (virus del papiloma humano) se recomienda para todos los niños de 9 a 12 años en dos dosis, separadas por al menos cinco meses.</i>		

Vacunas infantiles importantes

Vacunas	Enfermedad/Descripción de la infección
Vacuna(s) contra la Hepatitis A y B (HepA, HepB)	Hepatitis significa inflamación del hígado. El hígado es un órgano vital que procesa nutrientes, filtra la sangre y combate infecciones. Los virus causan hepatitis A y B.
Vacuna contra rotavirus (RV1, RV5)	El rotavirus se transmite fácilmente entre bebés y niños pequeños. El virus puede causar diarrea acuosa intensa, vómitos, fiebre y dolor abdominal.
Vacuna(s) contra la difteria, tétanos y tos ferina (DTaP, o Tdap para niños de 7 años en adelante)	La difteria puede provocar dificultad para respirar, insuficiencia cardíaca, parálisis o la muerte. El tétano provoca una rigidez dolorosa de los músculos, incluyendo el trismo, dificultad para tragar o respirar o la muerte. La pertusis, también conocida como "tos ferina", puede provocar una tos incontrolable que dificulta respirar, beber o comer.
Vacuna contra la influenza (IIV4, LAIV4-flu)	La influenza (también conocida como "flu") es una enfermedad respiratoria contagiosa causada por los virus de la influenza. Puede causar enfermedades de leves a graves y, en ocasiones, puede provocar la muerte.
Vacuna contra la polio (IPV)	La polio es una enfermedad incapacitante y potencialmente mortal causada por el poliovirus. El virus puede infectar la médula espinal de una persona y provocar parálisis.
Conjugado neumocócico (PCV15, PCV20)	La enfermedad neumocócica se refiere a cualquier enfermedad causada por bacterias neumocócicas. Estas incluyen neumonía, infecciones de oído, infecciones de los senos nasales, meningitis y bacteriemia.
Vacuna contra el COVID-19	El COVID-19 es causado por un virus llamado SARS-CoV-2. Con mayor frecuencia causa síntomas respiratorios que pueden parecerse mucho a un resfriado, influenza o neumonía.

Vacunas	Enfermedad/Descripción de la infección
Vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR)	El sarampión es una infección viral que causa fiebre y una erupción roja con manchas que generalmente aparecen primero en la cara y detrás de las orejas, luego se extiende hacia el pecho y la espalda y finalmente a los pies. Las paperas son una infección viral que afecta las glándulas salivales. Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolor e hinchazón de las glándulas salivales. La rubéola es una infección viral mejor conocida por su distintivo sarpullido rojo. Esta infección puede causar síntomas leves o ningún síntoma en la mayoría de las personas. Sin embargo, puede causar problemas graves a los fetos cuyas madres se infectan durante el embarazo.
Vacuna contra la varicela (VAR-chickenpox)	La varicela es una enfermedad altamente contagiosa causada por un virus. Puede causar un sarpullido parecido a una ampolla que pica. La erupción aparece primero en el pecho, la espalda y la cara y luego se extiende por todo el cuerpo.
Vacuna(s) contra la enfermedad meningocócica (MenACWY-CRM or MenACWY-TT)	La enfermedad meningocócica se refiere a cualquier enfermedad causada por una bacteria llamada Neisseria meningitidis. Estas enfermedades suelen ser graves, pueden ser mortales e incluyen infecciones del revestimiento del cerebro, la médula espinal y el torrente sanguíneo.
Vacuna contra el tétano y la difteria (Td, solo para niños de 7 años en adelante; generalmente se administra como dosis de refuerzo).	La difteria puede provocar dificultad para respirar, insuficiencia cardíaca, parálisis o la muerte. El tétano provoca una rigidez dolorosa de los músculos, incluyendo el trismo, dificultad para tragar o respirar o la muerte.
Human Papillomavirus Vaccine (VPH)	El VPH es la infección de transmisión sexual más común. Hay muchos tipos diferentes de VPH. Algunos tipos pueden causar problemas de salud, como verrugas genitales y cáncer.
Respiratory Syncytial Virus Vaccine (VRS)	El RSV es un virus respiratorio común que generalmente causa síntomas leves parecidos a los de un resfriado. Estos incluyen secreción nasal, disminución del apetito, tos, estornudos, fiebre y sibilancias.